

〇〇 〇〇様

処方日： 年 月 日

緊急避妊用女性ホルモン剤

医療機関名：

ノルレボ錠1.5mg

医師氏名：

レボノルゲストレル錠1.5mg「F」

電話番号：

服用日時： 年 月 日

AM・PM 時 分

服用前の注意

次に該当する方は、この薬を服用することができません。（重篤な肝障害のある方、妊婦）

服用後の注意

- 一時的ですが気持ちが悪くなったり、吐いたりする場合があります。この薬を服用後2時間以内に吐いてしまった場合は、追加服用の必要があるかもしれないので、すぐに処方してもらった医師に相談してください。
- 頭痛、めまい、腹痛、倦怠感、眠くなるなどの症状があらわれることがあります。
- 月経のような出血や不正子宮出血があらわれることがあります。
- 月経周期や出血の状況（日数や量）に一時的な変化が見られることがあります。
- セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズ・ワート）含有のサプリメントやハーブの摂取はしないように気をつけてください。
- この薬を服用しても、性感染症の予防にはなりません。心配な場合は医師に相談してください。
- この薬を服用しても、完全に妊娠が回避できるものではなく、妊娠・異常妊娠となる場合もあります。
- この薬の服用後も無防備な性交が行われた場合、妊娠する可能性が高まるので、妊娠を避けたいというのであれば、適切な避妊を行ってください。自分に合った避妊法については、医師または薬剤師に相談してください。

（授乳中の方のみ）

この薬の成分は乳汁中に移行しますので、授乳中の方は、服用後少なくとも24時間は授乳しないでください。

**この薬が本当に効いたかどうかは、服用後すぐにわかるわけではありません。
約3週間後に必ず産婦人科に受診して医師の診察を受けてください。
その際には、この【お薬情報提供文書】を持参してください。**

「緊急避妊の対面診療が可能な

産婦人科医療機関等の一覧」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite>

[/bunya/0000186912_00002.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html)

（厚生労働省ホームページ）



年 月 日

薬局名：

薬剤師氏名：

所在地：

電話番号：